

医療関係者各位

## 「リクシアナ<sup>®</sup>錠」と「リフキシマ<sup>®</sup>錠」の 販売名類似による取り違え注意のお願い

2017年10月

第一三共株式会社  
あすか製薬株式会社

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

また、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、第一三共株式会社製品「リクシアナ<sup>®</sup>錠」（一般名：エドキサバントシル酸塩水和物）：経口FXa阻害剤（抗凝固剤）」と、あすか製薬株式会社製品「リフキシマ<sup>®</sup>錠」（一般名：リファキシミン）：難吸収性リファマイシン系抗菌薬（肝性脳症における高アンモニア血症改善薬）」につきまして、販売名が類似していることから、誤った調剤による死亡例が報告されました。

「リクシアナ<sup>®</sup>錠」または「リフキシマ<sup>®</sup>錠」を処方・調剤いただく際には、今一度販売名、  
効能・効果および用法・用量をご確認いただき、また、処方時に薬剤オーダーリングシステム等  
をご使用の場合は、販売名の前に薬効を記載する等の予防策を検討するなど、取り違え防止に  
一層のご配慮を賜りますよう、お願い申し上げます。





謹白

### <事例>

リフキシマ<sup>®</sup>錠を処方された肝性脳症の患者に、誤って抗凝固剤のリクシアナ<sup>®</sup>錠が調剤されました。結果として、通常用量を超えたリクシアナ<sup>®</sup>錠が複数回投与され、消化管出血が発現し、死亡に至りました。

裏面も必ずご覧ください。

「**リクシアナ<sup>®</sup>錠**」または「**リフキシマ<sup>®</sup>錠**」を処方・調剤いただく際には、**販売名、効能・効果および用法・用量**をご確認ください。

販売名	<b>リクシアナ<sup>®</sup>錠</b>	<b>リフキシマ<sup>®</sup>錠</b>
一般名	エドキサバンチル酸塩水和物	リファキシミン
効能・効果	<p>① <b>非弁膜症性心房細動患者</b>における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制</p> <p>② <b>静脈血栓塞栓症</b>（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制</p> <p>③ 下記の<b>下肢整形外科手術施行患者</b>における静脈血栓塞栓症の発症抑制 膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術</p>	肝性脳症における高アンモニア血症の改善
用法・用量	<p>&lt;効能・効果①②&gt; 通常、成人には、エドキサバンとして以下の用量を<b>1日1回</b>経口投与する。 体重60kg以下：<b>30mg</b> 体重60kg超：<b>60mg</b> なお、腎機能、併用薬に応じて<b>1日1回30mg</b>に減量する。</p> <p>&lt;効能・効果③&gt; 通常、成人には、エドキサバンとして<b>30mg</b>を<b>1日1回</b>経口投与する。</p>	通常、成人にはリファキシミンとして <b>1回400mg</b> を <b>1日3回</b> 食後に経口投与する。
製品 (製品写真)	<p>リクシアナ<sup>®</sup>錠15mg</p>  <p>リクシアナ<sup>®</sup>錠30mg</p>  <p>リクシアナ<sup>®</sup>錠60mg</p> 	<p>リフキシマ<sup>®</sup>錠200mg</p> 
製造販売元	第一三共株式会社 【お問い合わせ先】製品情報センター TEL 0120-189-132 受付時間 月～金 9:00～17:30 (祝日および当社休日を除く)	あすか製薬株式会社 【お問い合わせ先】くすり相談室 TEL 0120-848-339 受付時間 月～金 9:00～17:30 (祝日および当社休日を除く)

製品のご使用にあたっては最新の添付文書をご確認ください。